

## Empirische AB therapie voor infecties bij Oekraïense vluchtelingen

### 0-18 jaar

*Denk naast reguliere diagnostiek ook aan oppervlaktekweken moeder (bij neonaten) en kind*

*Laagdrempelig advies vragen aan medisch microbioloog en/of kinderinfectioloog*

*Voor versmallen en/of iv/oral switch: graag contact met medisch microbioloog en/of kinderinfectioloog*

<i>focus</i>		Geen sepsis	Sepsis
Longen	CAP -zh opname	Cf huidige advies	Cf huidige advies
	HAP	Cf huidig advies	<b>Cf huidig advies</b>
Abdominaal		Cf huidige advies	Cf huidige advies
Urinewegen		Cefuroxim + amikacine	Meropenem
	Patiënt met NTx/NFST	Meropenem	Meropenem
Huid/Weke delen/Bot		<u>Klinisch:</u> Vancomycine  <u>Poliklinisch:</u> Clindamycine	Flucloxacilline + Vancomycine
Zonder focus neonataal (EOS en LOS)		n.v.t.	Meropenem in meningitisdosering (i.v.m. E. coli)
Zonder focus niet neonataal		Cf huidig advies	Meronem
Meningitis		n.v.t.	Cf huidig advies Ceftriaxon